

ADVIES OOGSTSTADIUM SNIJBLOEMEN

De sierwaarde en houdbaarheid van snijbloemen is vaak sterk afhankelijk van het oogststadium. Het ideale ontwikkelingsstadium van de bloemen bij de oogst varieert sterk van soort tot soort en zelfs van cultivar tot cultivar. Sommige bloemen kunnen geoogst worden in knopstadium, maar bij vele zomerbloemen geldt vaak dat, indien ze te rauw worden geoogst, ze nooit hun volledige sierwaarde bereiken. Anderzijds gaan de bloemen, eens ze werden bestoven door insecten of wind, veelal snel verwelken en zaad vormen. Het is dan ook raadzaam voor de meeste soorten om de bloemen te oogsten voordat de bestuiving plaatsvond. Hieronder wordt voor een aantal gewassen het adviesstadium weergegeven voor een optimaal vaasleven.

Botanische naam	Nederlandse naam	Advies oogststadium
<i>Achillea millefolium</i>	duizendblad	als 80% van de bloeiwijze geopend is of stuifmeel zichtbaar op de bloeiwijze, te jong oogsten resulteert in te snel verwelken
<i>Agastache</i>	droplant	als de bloeiwijze 1/2 tot 2/3 geopend is
<i>Ageratum houstonianum</i>	Mexicaantje, leverbalsem	als de centrale bloem volledig geopend is en de zijbloemen goed gekleurd zijn
<i>Agrostemma gracilis</i>	Oosterse bolderik	als de knoppen openen
<i>Alchemilla mollis</i>	vrouwenmantel	als de bloemen volledig geopend zijn
<i>Allium giganteum</i>	sierui	als er enkele (nog niet veel!) bloemetjes open staan
<i>Amaranthus caudatus</i>	kattenstaartamarant	als 3/4 van de bloeiwijze geopend is
<i>Ammi majus</i>	groot akkerscherf	als ongeveer 80% van de bloemetjes in het scherm geopend zijn
<i>Anemone coronaria</i>	anemoon	als de bloemen beginnen te openen
<i>Anethum graveolens</i>	dille	als de helft van de bloemetjes in het hoofdscherf geopend is
<i>Ammi visnaga</i>	fijn akkerscherf	als de eerste 2 à 3 bloemetjes van het bloemhoofd geopend zijn
<i>Antirrhinum majus</i>	leeuwenbek	als de onderste 2 à 3 bloemen geopend zijn
<i>Aquilegia</i>	akelei	als de bloemen geopend zijn, maar vooraleer de bloemen blaadjes verliezen
<i>Aster</i>	aster	als ongeveer 1/4 van de bloemen open staan
<i>Astilbe</i>	pluimspirea	als de pluim 1/2 à 2/3 bloeit, de bloemetjes die nog gesloten zijn bij de oogst komen nagenoeg niet meer open
<i>Astrantia major</i>	Zeeuws knoopje	als de hoofdbloemen volledig geopend zijn
<i>Bupleurum rotundifolia</i>	goudscherf	als de bloemen bijna volledig geopend zijn, bloemen ontwikkelen niet meer nadat ze werden geoogst
<i>Calendula officinalis</i>	goudsbloem	als de bloemen halfopen zijn
<i>Callistephus chinensis</i>	Chinese aster, zomeraster	als de bloemen volledig geopend zijn
<i>Campanula portenschlagiana</i>	klokjesbloem	als de bovenste knop kleurt en net opent
<i>Carthamus tinctorius</i>	saffloer	als de bloem begint te openen en de kleur duidelijk zichtbaar is
<i>Centaurea cyanus</i>	korenbloem	als de bloem 1/4 tot 1/2 geopend is, indien meerdere bloemen per tak, oogsten wanneer de hoofdknop 3/4 geopend is
<i>Cerithe major</i>	grote wasbloem	als de schutbladeren donker kleuren en de bloemen paars zijn

Botanische naam	Nederlandse naam	Advies oogststadium
<i>Chrysanthemum carinatum</i>	bonte ganzenbloem	als de bloemen 1/2 tot 2/3 geopend zijn
<i>Chrysanthemum segetum</i>	gele ganzenbloem	als de bloemen 1/2 tot 2/3 geopend zijn
<i>Consolida ajacis</i>	éénjarige ridderspoor	als 2 tot 5 bloemen geopend zijn of tot 1/3 van de bloemstengel geopend is
<i>Coreopsis tinctoria</i>	meisjesogen	als de bloemen beginnen te openen
<i>Cosmos bipinnatus, C. sulphureus</i>	cosmea	als de knop gekleurd is maar nog niet volledig geopend
<i>Crococsmia</i>	montbretia	als de onderste bloemen kleur tonen
<i>Dahlia</i>	dahlia	als 3/4 tot alle bloemen geopend zijn, maar vooraleer de buitenste bloemblaadjes beginnen verwelken
<i>Daucus carota</i>	wilde peen	als de bloemen geopend zijn en het scherm plat is
<i>Delphinium</i>	meerjarige ridderspoor	als 1/4 tot 1/3 van de bloemen op de steel geopend zijn
<i>Dianthus barbatus</i>	duizendschoon	als 10 tot 20 % van de bloemen in de bloeiwijze geopend zijn
<i>Digitalis</i>	vingerhoedskruid	als 1 à 2 bloemen op de steel tot maximaal de helft van de bloeiwijzen geopend zijn
<i>Echinacea purpurea</i>	rode zonnehoed	als de bloemblaadjes openen, wanneer enkel het bloemhoofd wordt gebruikt, dan oogsten als de bloem volledig op kleur is
<i>Echinops</i>	kogeldistel	als 1/2 tot 3/4 van de bloeiwijze blauw gekleurd is, bij te vroege oogst, komt de bloeiwijze niet geheel open
<i>Eryngium planum</i>	kruisdistel	als de gehele bloemkop en schutbladen gekleurd zijn
<i>Euphorbia</i>	wolfsmelk	als de schutbladen volledig gekleurd zijn, maar vooraleer de bloemen volledig bloeien
<i>Gladiolus</i>	gladiool	als 1 tot 5 bloemen geopend zijn
<i>Gomphrena</i>	kogelamarant	als de bloemen volledig kleur tonen, maar voor ze volledig geopend zijn
<i>Gypsophila elegans</i>	éénjarig gipskruid	als 70 tot 90% van de bloemen geopend zijn
<i>Helianthus annuus</i>	zonnebloem	van zodra de eerste bloemblaadjes zich ontvouwen, kan verschillen per cultivar
<i>Helichrysum bracteatum</i>	strobloem	als het centrum volgroeid is en de bloemblaadjes bijna helemaal open staan
<i>Hypericum</i>	hertshooi	als de vruchten volledig verkleurd zijn
<i>Iris hollandica</i>	Hollandse boliris	als het hoofdbloem volledig geopend is
<i>Lathyrus odoratus</i>	reukerwt	als twee tot drie bloemen kleur tonen
<i>Lavatera trimestris</i>	grootbloemige lavatera, bekermalva	als de bloemen beginnen te ontkrullen of net geopend zijn
<i>Liatris spicata</i>	lampepoetser	van zodra de aar 1 tot max. 4 cm geopende bloemetjes vertoont
<i>Limonium sinuatum</i>	statice, lamsoor	als ongeveer 80% van de bloemen geopend is
<i>Lysimachia clethroides</i>	wederik	als 1/3 tot 1/2 van de bloemen op de bloeiwijze geopend zijn
<i>Molucella laevis</i>	klokken van Ierland, Ierse bellen	zodra er zich groene klokjes beginnen te vormen
<i>Monarda</i>	bergamot	als de bloem begint te kleuren
<i>Narcissus</i>	narcis	bij enkelbloemige soorten als de bloemen kleurtonend zijn, bij dubbelbloemige als de bloemen beginnen openen

Botanische naam	Nederlandse naam	Advies oogststadium
<i>Nigella damascena</i>	juffertje-in-het-groen	als de knoppen openbreken en de bloemkleur duidelijk zichtbaar is
<i>Paeonia lactiflora</i>	pioen	als de knop nog gesloten is maar kleur toont en zachter begint aan te voelen
<i>Papaver nudicaule</i>	klaproos	als de knop kleur toont, maar nog maar nauwelijks openbreekt
<i>Phlox paniculata</i>	vlamboem	als de onderste 2 à 3 bloemen geopend zijn tot maximaal 1/2 van de bloeiwijze geopend is
<i>Ranunculus asiaticus</i>	ranonkel	als de bloemen kleur tonen tot beginnen openen
<i>Rudbeckia</i>	zonnehoed	als de bloemen beginnen te openen
<i>Salvia leucantha</i>	Mexicaanse salie	als bij 3 à 4 onderste bloemen de witte bloemblaadjes uit de paarse kelkblaadjes komen
<i>Scabiosa atropurpurea</i>	duifkruid	als de bloemen beginnen te openen
<i>Sedum</i>	vetkruid	mag al geoogst worden wanneer de bloemen nog groen zijn, alsook in bloeiend stadium
<i>Solidago</i>	guldenroede	als de pluim begint te kleuren
<i>Tagetes</i>	Afrikaantjes	als de bloemen volledig geopend zijn, maar nog stevig zijn in het centrum
<i>Tanacetum parthenium</i>	moederkruid	als de bloemen helemaal geopend zijn
<i>Tulipa</i>	tulp	zodra de knoppen kleurtonend zijn
<i>Vaccaria hispanica</i>	koekruid	als 1 à 2 bloemen per scherm geopend zijn
<i>Verbena bonariensis</i>	ijzerhard	als de meeste bloemen geopend zijn
<i>Veronica</i>	ereprijs	als 1/3 tot 1/2 van de bloemen op de bloeiwijze geopend zijn
<i>Zinnia</i>	/	als de bloemen volledig geopend zijn

Geraadpleegde bronnen:

Armitage A. M. & Laushman J. M. (2003) Specialty cut flowers. Timber Press, Inc. 586 p.

Benzakein R. (2017) Floret Farm's Cut Flower Garden. Chronicle Books. 308 p.

Consulentschap in algemene dienst voor de bloemisterij. Proefstation voor de bloemisterij te Aalsmeer. Proefstation voor de tuinbouw onder glas te Naaldwijk (1987). Teelt van zomerbloemen. Buiten en onder glas. Geheel herziene en uitgebreide druk van de voormalige delen I en II. 219 p.

Jentzsch M. (2007) Produktion von Freilandschnittblumen. Eugem Ulmer KG. 184 p.

www.johnyseeds.com

Deze fiche werd opgemaakt in het kader van het PDPO-project 'Biobloemen: kleur van op het bioveld tot bij de consument'

